

定期予防接種一覧表



予防接種名	標準的な接種期間等	接種可能期間
小児用肺炎球菌	I 期初回 : 生後 2 か月～7 か月に至るまでに 27 日以上の間隔で 3 回 I 期追加 : 初回終了後 60 日以上の間隔で 1 回	生後 2 ヶ月～5 歳の 誕生日の前日まで
B型肝炎	初回 : 生後 2 か月～9 か月に至るまでに 27 日の間隔で 2 回 追加 : 1 回目の接種から 139 日以上あけて 1 回	1 歳の誕生日の前日まで
ロタウイルス	ロタリックス 1 回目 : 生後 2 か月～14 週 6 日までに 1 回 2 回目 : 1 回目から 27 日以上の間隔をおいて 1 回	生後 6 週～24 週まで
	ロタテック 1 回目 : 生後 2 か月～14 週 6 日までに 1 回 2・3 回目 : 1 回目から 27 日以上の間隔で 2 回	生後 6 週～32 週まで
BCG(結核)	生後 5 ヶ月～8 ヶ月に達するまでに 1 回	1 歳の誕生日の前日まで
5 種混合 (ジフテリア／百日せき／破傷風／急性灰白髄炎(ポリオ)／Hib 感染症)	I 期初回 : 生後 2 か月～7 か月に至るまでに開始し、 20 日から 56 日までの間隔をおいて 3 回 I 期追加 : 初回接種終了後から 6 か月～18 か月の間隔をおいて 1 回	生後 2 ヶ月～7 歳 6 ヶ月に達する日の前日まで
2 種混合 (ジフテリア／破傷風)	II 期 : 11 歳～12 歳に達するまでに 1 回	11 歳～13 歳の 誕生日の前日まで
すいとう 水痘(水ぼうそう)	1 回目 : 生後 12 か月～15 か月に達するまでに 1 回 2 回目 : 1 回目接種後から 3 か月後(標準的には 6 か月～12 か月後)に 1 回接種	1 歳～3 歳の 誕生日の前日まで
MR 混合 (麻しん／風しん)	I 期 : 1 歳～2 歳に達するまでに 1 回	1 歳～2 歳の 誕生日の前日まで
	II 期 : 小学校就学前(保育園・幼稚園等の年長児相当)の 1 年間に 1 回	小学校入学の前年度の 4 月 1 日～3 月 31 日まで
日本脳炎	I 期初回 : 3 歳～4 歳に達するまでに 6 日～28 日 までの間隔をおいて 2 回 I 期追加 : 初回接種後からおおむね 1 年おいて 1 回	生後 6 ヶ月～7 歳 6 ヶ月に 達する日の前日まで
	II 期 : 9 歳～10 歳に達するまでに 1 回	9 歳～13 歳の誕生日の 前日まで
ヒトパピローマウイルス感染症 (子宮頸がん)	サーバリックス(2 価ワクチン) 1・2 回目 : 中学 1 年時に 1 か月の間隔をおいて 2 回 3 回目 : 1 回目接種から 6 か月の間隔をおいて 1 回	小学 6 年生から高校 1 年 相当の年度の 3 月 31 日まで 【女子のみ対象】
	ガーダシル(4 価ワクチン) 1・2 回目 : 中学 1 年時に 2 か月の間隔をおいて 2 回 3 回目 : 1 回目接種から 6 か月の間隔をおいて 1 回	
	シルガード(9 価ワクチン) ●1 回目接種を 15 歳までに接種する場合 1・2 回目 : 中学 1 年生時に 6 か月の間隔をおいて 2 回 ●1 回目接種を 15 歳以降に接種する場合 1・2 回目 : 中学 1 年生時に 2 か月の間隔をおいて 2 回 3 回目 : 1 回目接種から 6 か月の間隔をおいて 1 回	



※接種可能期間は法の改正等により変更になる場合があります。

令和 6 年 4 月作成