

定期予防接種一覧



対象疾病	ワクチン	対象者の範囲	回数	間隔
ロタウイルス感染症	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン (ロタリックス®)	出生6週0日～24週0日までの間にある者	2回	
	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン (ロタテック)	出生6週0日～32週0日までの間にある者	3回	27日以上
B型肝炎	組換え沈降B型肝炎ワクチン	1歳までの者	初回:2回 追加:1回	初回:27日以上 追加:1回目の接種から139日以上
小児の肺炎球菌感染症	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン ※当面の間、沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンも使用可能。	生後2月～60月に至るまでの間にある者	◎初回接種時が	
			〔生後7月に至るまでの間の場合〕 初回:3回 追加:1回	初回:27日以上 追加:初回接種終了後60日以上(生後12月以降)
			〔生後7月～12月に至るまでの間の場合〕 初回:2回 追加:1回	初回:27日以上 追加:初回接種終了後60日以上
			〔生後12月～24月に至るまでの間の場合〕 2回	60日以上
			〔生後24月～60月に至るまでの間の場合〕 1回	
五種混合	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン (DPT-IPV-Hib)	生後2月～生後90月に至るまでの間にある者	1期初回:3回 1期追加:1回	1期初回:20日以上 1期追加:初回接種終了後6月以上
四種混合	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(DPT) 又は 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT) 又は 不活化ポリオワクチン(IPV)	生後2月～生後90月に至るまでの間にある者	1期初回:3回 1期追加:1回	初回:20日以上 追加:初回接種終了後6月以上

Hib感染症	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン	生後2月～生後60月 に至るまでの間 にある者	◎初回接種が	
			[生後7月～12月 に至るまで] 初回:3回 追加:1回	初回:27日以上 追加:初回接種終 了後7月以上
			[生後7月～12月 に至るまで] 初回:2回 追加:1回	初回:27日以上 追加:初回接種終 了後7月以上
			[生後12月～60月 に至るまで] 1回	
二種混合	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド (DT)	[2期] 11歳～13歳未満の 者	1回	
結核	BCGワクチン	1歳までの者	1回	
麻しん・風しん	乾燥弱毒生麻しん風しん混合(MR)ワ クチン 又は 乾燥弱毒生麻しん(M)ワクチン 又は 乾燥弱毒生風しん(R)ワクチン	[1期] 生後12月～24月 に至るまでの間に ある者	1回	
		[2期] 5歳～7歳未満の 者 (年長相当)	1回	
水痘	乾燥弱毒生水痘ワクチン	生後12月～36月 に至るまでの間に ある者	2回	3月以上
日本脳炎	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	[1期初回] 生後6月～90月 に至るまでの間に ある者	2回	6日以上
		[1期追加] 生後6月～90月 に至るまでの間に ある者	1回	初回接種終了後6 月以上
		[第2期] 9歳～13歳未満の 者	1回	

HPV	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン	12歳となる年度から16歳となる年度までの間にある女子	◎初回接種が	
			[15歳未満] 2回	6月
			[15歳以上] 3回	2月の間隔をおいて2回、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回
RSウイルス感染症	組換えRSウイルスワクチン	妊娠28週～37週に至るまで間にある妊婦	1回	



法令等の改正により変更になる場合があります。